

SUSPENSIÓN ORAL

VitaKID[®]
crecimiento

180 mL

Elifarma

VitaKID[®]
crecimiento

Calcio + Zinc +
Magnesio +
Vitamina D₃

300 mg + 7,5 mg +
50 mg + 100 UI / 5 mL



SUSPENSIÓN ORAL 180 mL

+

FÓRMULA: Cada cucharadita (5 mL) contiene:

Calcio como carbonato de calcio	300 mg
Vitamina D ₃ como colecalciferol 100 000 UI/g	100 UI
Magnesio como hidróxido de magnesio pasta	50 mg
Zinc como gluconato de zinc	7,5 mg
Excipientes c.s.p.	

Suplemento nutricional

Vía de administración: Oral

Incluye dosificador

Fabricado por:
Laboratorios Elifarma S.A.
R.S. N° DN-0201 • R.U.C. N° 20101129153
Av. Separadora Industrial N° 1823
Ate, Lima - Perú

LOTE: ÁREA SIN BARNIZ
EXP.: 2,5 x 1,5 cm

Elifarma

VitaKID[®]
crecimiento

Calcio + Zinc +
Magnesio +
Vitamina D₃

300 mg + 7,5 mg +
50 mg + 100 UI / 5 mL



SUSPENSIÓN ORAL 180 mL

⊖

DOSIS:

Administrar 2,5 mL al día para niños de 1 a 3 años; 5 mL al día de 4 a 8 años; 15 mL al día de 9 a 13 años; 20 mL al día de 14 a 18 años; y 25 mL al día los mayores de 19 años.

Tomar unas pocas horas antes o después de tomar otros medicamentos. No superar la dosis diaria recomendada, excepto sea por indicación médica.

No debe de utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Algunas personas pueden experimentar diarrea con dosis mayores a 350 mg/día de magnesio.

⚠

Agitarse bien antes de usar.

Conservar a no más de 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos.



PRODUCTO PERUANO

ESPACIO PARA
CÓDIGO DE
BARRAS



FÓRMULA: Cada cucharadita (5 mL) contiene:

Calcio como carbonato de calcio	300 mg
Vitamina D ₃ como colecalciferol 100 000 UI/g	100 UI
Magnesio como hidróxido de magnesio pasta	50 mg
Zinc como gluconato de zinc	7,5 mg
Excipientes c.s.p.	

Suplemento nutricional

Vía de administración: Oral

Fabricado por: Laboratorios Elifarma S.A.
R.S. N° DN-0201 • R.U.C. N° 20101129153
Av. Separadora Industrial N° 1823
Ate, Lima - Perú

LOTE:
EXP.:

AREA
SIN BARNIZ
17 X 10 mm

VitaKID[®]

crecimiento

**Calcio + Zinc +
Magnesio +
Vitamina D₃**

300 mg + 7,5 mg +
50 mg + 100 UI / 5 mL

180 mL

 **SUSPENSIÓN ORAL**



DOSIS:

Administrar 2,5 mL al día para niños de 1 a 3 años; 5 mL al día de 4 a 8 años; 15 mL al día de 9 a 13 años; 20 mL al día de 14 a 18 años; y 25 mL al día los mayores de 19 años.

Tomar unas pocas horas antes o después de tomar otros medicamentos. No superar la dosis diaria recomendada, excepto sea por indicación médica.

No debe de utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Algunas personas pueden experimentar diarrea con dosis mayores a 350 mg/día de magnesio.

Agítese bien antes de usar.

Conservar a no más de 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos.
